

الجدول الوطني للتلقيح

ذ. محمد بريكات

المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع



لقاح ضد شلل الأطفال

تشكل الأمراض الوبائية بالمغرب نسبة 50 % من أسباب وفيات الأطفال. كما تشكل الأمراض المتعلقة بمرحلة الولادة نسبة 37 %. لذلك حددت وزارة الصحة من خلال خطة عملها لفترة 2008-2012 وكهدف من أهدافها الأولية. تقليص معدلات وفيات الأطفال دون السنة الأولى بنسبة تصل إلى 15 حالة في كل 1000 ولادة حية خلال سنة 2012. و من أجل تحقيق هذا الهدف. كان لابد من العمل على تقوية وتعزيز البرنامج الوطني للتلقيح.

يعتبر التلقيح من أنجع الوسائل للحد من وفيات و مرضية (morbidity) الرضع و الأطفال حديثي الولادة، بل هو حق أساسي من حقوق الطفل. و هو أيضا عمل فردي و وقاية جماعية، حيث ينفذ كل سنة ما يقارب ثلاثة ملايين حياة، و يجنب أكثر من 750.000 طفل مضاعفات الأمراض الوبائية و الإعاقات الناتجة عنها.

في هذا الإطار، كان المغرب من بين الدول الرائدة التي التزمت و تعهدت بضمان حق الطفل في التلقيح وفقا للمادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل، فمنذ أكثر من ثلاثين سنة شكل التلقيح جزءا من برنامج تطبعه الفعالية والكفاءة و الديناميكية، و هو برنامج منظم يساهم في خفض معدلات المرضة و وفيات الرضع و الأطفال.

يتم تحديد الأمراض المستهدفة و الساكنة المستفيدة من فوائد الجدول الوطني للتلقيح، الذي يعرف تطورا من أجل التكيف مع احتياجات و سياق مكافحة الأوبئة بالمغرب، والذي تم الإجماع عليه من طرف كل من الخبراء المعيّنين لهذا الغرض، و أعضاء اللجنة الوطنية العلمية و التقنية للتلقيح.

الأمراض المستهدفة من خلال البرنامج الوطني للتلقيح حاليا هي:

- السّل (tuberculose).

- شلل الأطفال (poliomyélite).

- السعال الديكي (العواية) (coqueluche).

- الكزاز (tétanos).

- الدفتيريا (diphthérie).

- التهاب الكبد الفيروسي نوع «ب» (hépatite B).

- التهاب السحايا (méningite) الناتج عن مكروب

الهيموفيليس نوع «ب».

- الحصبة (rougeole).

- الحميراء (rubéole).

- الالتهابات و التعفّنات الناتجة عن مكروب المكورة الرئوية

(pneumocoque) وخاصة الالتهابات التنفسية، التهاب السحايا

و التهابات الأذن الوسطى.

- حالات الإسهال الناتجة عن فيروس الروتا (rotavirus)

الذي يسبب إصابات حادة قد تؤدي إلى الاجتفاف.

يشمل برنامج التلقيح المواعيد التالية و يبين الجدول الموالي

تفاصيل التلقيح لكل موعد:

- أثناء 24 ساعة الأولى بعد الولادة.

- خلال الشهر الأول بعد الولادة.



لقاح بالحقن

- الشهر الثاني.
- الشهر الثالث.
- الشهر الرابع.
- الشهر التاسع.
- الشهر الثاني عشر.
- الشهر الثامن عشر.
- السنة الخامسة.

يجب على جميع الأسر أن تصطحب أطفالها إلى المراكز الصحية من أجل الاستفادة من كل هذه اللقاحات المتوفرة بالمراكز الصحية و بالمجان بالإضافة إلى اللقاح ضد الكزاز الخاص بالنساء في طور الإنجاب لتفادي الكزاز الوليدي.

السن	اللقاحات	ملاحظات
24 ساعة بعد الولادة	التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب"	
عند الولادة (شهر بعد الولادة)	-التلقيح ضد السل ب.س.ج BCG -التلقيح (0) ضد شلل الأطفال	
الشهر الثاني	- التلقيح الأول ضد الدفتيريا الخناقية، الكزاز والسعال الديكي (العواية) (Hib) - التلقيح الأول ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب" - التلقيح الأول ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب" - التلقيح الأول ضد شلل الأطفال - التلقيح الأول ضد الروتيفيروس - التلقيح الأول ضد المكورة الرئوية	لقاح موحد
الشهر الثالث	- التلقيح الثاني ضد الدفتيريا الخناقية، الكزاز والسعال الديكي (العواية) (Hib) - التلقيح الثاني ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب" - التلقيح الثاني ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب" - التلقيح الثاني ضد شلل الأطفال - التلقيح الثاني ضد الروتيفيروس	إذا لم يتم إعطاء اللقاح التهاب الكبد ضد الفيروسي نوع "ب" خلال 24 ساعة بعد الولادة
الشهر الرابع	- التلقيح الثالث ضد الدفتيريا الخناقية، الكزاز والسعال الديكي (العواية) (Hib) - التلقيح الثالث ضد الهيموفيلوس أنفلونزا نوع "ب" - التلقيح الثالث ضد شلل الأطفال - التلقيح الثاني ضد المكورة الرئوية	لقاح موحد
الشهر التاسع	- التلقيح ضد الحصبة - التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي نوع "ب"	
الشهر الثاني عشر	- التلقيح الثالث ضد المكورة الرئوية	
الشهر الثامن عشر	- التلقيح ضد الدفتيريا، الخناقية، الكزاز وشلل /الحميراء الحصبة أو الحصبة/الحميراء أو الحصبة/ النكاف	التذكير الأول
السنة الخامسة	- التلقيح ضد الدفتيريا، الخناقية والكزاز وشلل	التذكير الثاني
كل عشر سنوات	- الدفتيريا و الكزاز + الشلل	

الملحق اللغوي

vaccination :	تلقيح
hépatite virale :	التهاب الكبد الفيروسي
tuberculose :	السل
BCG :	ب.س.ج
diphtérie :	الدفتيريا الخناقية
tétanos :	الكزاز
coqueluche :	السعال الديكي
pneumocoque :	المكورة الرئوية
rougeole :	الحصبة
poliomyélite :	شلل الأطفال
méningite :	التهاب السحايا
rubéole :	الحميراء
otites moyennes :	التهابات الأذن الوسطى
diarrhée :	الإسهال
déshydratation :	اجتفاف
oreillons :	نكاف

موقع التلقيح و التلقيحات بالمغرب : www.vacmar.ma

www.vacmar.ma/index.php

Vaccins et Vaccinations au Maroc
Site d'informations médicales de vaccinologie destiné aux professionnels de soins de santé et de prévention

Recherche... OK

Accueil A propos de Vacmar Publications Agenda Partenaires et Liens Web Contact

Actualités vaccinales

Calendrier vaccinal

Pratique vaccinale

Epidémiologie et données marocaines

Vaccins au Maroc

Questions aux experts

Epidémiologie du pneumocoque au Maroc en 2006-2008 et implications pour le Programme National d'Immunisation
N. El Mdaghri*, H. Belabbes, J. Najib, K. Zerouali Ouariti, M. Benbachir Service de Microbiologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca - Jeudi 10 Mars 2011
Afin d'aider les décideurs dans le choix de la formule vaccinale du vaccin pneumococcique conjugué (PCV) la plus adaptée qui sera introduite dans le Programme National d'Immunisation, le laboratoire de Microbiologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca assure l...

A propos de Vacmar
Le domaine de la vaccinologie pédiatrique connaît des développements considérables avec l'afflux de nombreux nouveaux vaccins et de nouvelles combinaisons vaccinales conduisant aux remaniements permanents et à l'adaptation continue des calendriers vaccinaux. Ainsi dans notre pays, grâce aux vaccinations, certaines pathologies de l'enfant telles que la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, la coqueluche ou la rougeole font désormais partie du pass...

POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS A PNEUMOCOQUES
La plus large couverture de sérotypes

Lire la suite Lire la suite